

หนอน กระตักดำ ในข้าว



รูปร่างลักษณะ

มีสีเทาถึงเขียวแกมดำ ด้านหลังมีลายตามความยาวของลำตัวจากหัวจรดท้าย แต่ละปล้องมีจุดสีดำ ขนาดโตเต็มที่ยาวประมาณ 3.5-4 มิลลิเมตร กว้าง 5-6 มิลลิเมตร



ตัวเต็มวัย

เป็นผีเสื้อกลางคืน ปีกคู่หน้าสีเทาปนน้ำตาล ปีกคู่หลังสีขาว



แนวทางป้องกัน/แก้ไข

- 1 โดฟลิกดิน เพื่อทำลายดักแด้ที่อยู่ในดิน หรือตอซัง
- 2 ทำการจัดวัชพืชตามคันนาหรือบริเวณใกล้เคียง เพื่อทำลายแหล่งอาศัย
- 3 ใช้สารฆ่าแมลง (ชนิดใดชนิดหนึ่ง)
 - มาลาโทออน (มาลาโรออน 83% EC) อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร
 - เฟนิโตรโทออน (ซูมิโทออน 50% EC) อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร
 * ฉีดพ่นเมื่อพบใบข้าวถูกทำลายมากกว่า 15 เปอร์เซ็นต์



ลักษณะการทำลายและการระบาด

โดยทั่วไปหนอนจะทำลายข้าวในเวลากลางคืน หนอนระยะแรกจะกัดกินผิวข้าว เมื่อโตขึ้นจะกัดกินทั้งใบ และต้นข้าว เหลือไว้แต่ก้านใบ ตัวหนอนจะกัดกินต้นกล้าระดับพื้นดิน นาข้าวจะถูกทำลายแหว่งเป็นหย่อม ๆ และสามารถทำความเสียหายทั้งหมดได้ภายใน 1-2 วัน

หนอนมีการเคลื่อนย้ายเป็นกลุ่มคล้ายกองทัพ จากการขยายพันธุ์หลาย ๆ รุ่นบนวัชพืชพวกหญ้า และเคลื่อนเข้าสู่แปลงกล้าและนาข้าวจากแปลงหนึ่งไปยังอีกแปลงหนึ่ง มักพบระบาดในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะหลังจากผ่านช่วงแล้งที่ยาวนาน แล้วตามด้วยฝนตกหนัก การระบาดจะรุนแรงเป็นบางปี บางพื้นที่



กลุ่มอารักขาพืช ปรารังบุรี

ตัวหนอนฟักจากไข่ช่วงเช้าตรู่ และรวมกลุ่มกันกัดกินส่วนปลาย ใบข้าว กลางวันจะหลบอยู่ในดินใต้เศษใบพืช ในพื้นที่ที่แห้ง บางส่วนอยู่บนต้นข้าวส่วนที่อยู่เหนือน้ำในนาที่ลุ่ม ชอบเข้าดักแด้ในดินหรือบนต้นหญ้าตามขอบแปลง

i ที่มาข้อมูล : กรมการข้าว
 รูปภาพ : ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี
 จัดทำโดย : นางสาวศิริวรรณ ตี้อย
 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

