

Anthrax



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Public Health Office

โรคแอนแทรกซ์

เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย พบได้ทั่วไปตามธรรมชาติ โดยเฉพาะในดิน น้ำ และวัสดุจากพืช สัตว์ เชื้อทนความร้อน และเย็นได้ดี สามารถอยู่ในดินได้นานกว่า 10 ปี

การติดต่อ



การรับประทาน
เนื้อสัตว์หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่มีเชื้อ



การสัมผัสสัตว์
ที่ป่วยหรือตาย
ผิดปกติ



ติดจากการหายใจ
ฝุ่นดินที่มีสปอร์
เชื้อเข้าไป

**สัตว์พาหะหลัก คือ โค กระบือ
แพะ แกะ**

ระยะฟักตัว



ระยะฟักตัวของโรค
**1- 5 วัน หรืออาจนาน
ถึง 60 วัน**



Anthrax



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Public Health Office

โรคแอนแทรกซ์

อาการ



มีแผลคล้ายฝีหรือ

หากมีอาการรุนแรง
มีโอกาสเสียชีวิตร้อยละ 80



ปวดท้อง
รุนแรง



หายใจติดขัด
หายใจลำบาก



มีไข้



คลื่นไส้ อาเจียน

การป้องกัน



หลีกเลี่ยงการสัมผัส โค กระบือ
แพะ แกะ



ล้างมือ ขำระล้างร่างกาย หลัง
สัมผัสสัตว์



เลือกบริโภคเนื้อสัตว์ ที่ได้รับ
การรับรอง อาหารปลอดภัย



หากพบสัตว์ป่วยตายผิดปกติ ให้
แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที



หากมีอาการผิดปกติให้รีบ
พบแพทย์





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

ตระหนัก แต่! **หยุดเสี่ยง**
ไม่ตระหนัก

เลียงแอนแทรกซ์ (Anthrax)

! ย้ำ !!! ไม่แพร่จากคนสู่คน

หยุด - สัตว์ - เสี่ยง

ได้แก่ วัว ควาย
แพะ แกะ



หากสัตว์ตายไม่ทราบสาเหตุ

ห้าม !

สัมผัส เคลื่อนย้าย ฆ่าซาก ชำแหละ
หรือนำไปบริโภคโดยเด็ดขาด

หยุด - อาหาร - เสี่ยง



งด !

เนื้อวัว ควาย แพะ แกะดิบ
เมื่อกินเนื้อสัตว์ที่มีเชื้อ



ผู้สัมผัส/กิน สัตว์ตายไม่ทราบสาเหตุ

ผิวหนังมีตุ่มดำแล้วแตกออก

เป็นแผลยกขอบตรงกลางบวมมีสีดำ

คล้ายบุหรี่ยี่ (black escalete)

มีไข้ ปวดตามตัว ปวดท้อง คลื่นไส้

อาเจียน อูจจาระร่วง หรือถ่ายเป็นสีดำ

ไอ หายใจไม่อึด เจ็บหน้าอก

ให้เข้ารับการคัดกรอง

ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านโดยทันที

เป็นแล้วถึงตาย !



นายแพทย์ณรงค์ จันทรแก้ว

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง โทร 042 611450 ต่อ 125